



## Kazuistika: PL01-L/2013

### Léčba selhání metabolismu dolních končetin

Pacient:	M.N.,
Stáří:	90 let,
Diagnóza:	Selhání metabolismu dolních končetin od kolen níže pod vlivem ischemie a infekce u chronických bérceových vředů, s rizikem vzniku gangrény pravé dolní končetiny, kde šlo o suspektní nekrotizující fasciitidu oblasti Achillovy šlachy až lýtka.
Rozsah postižení:	Rozsah problému je patrný z úvodních obrázků fotodokumentace.
Průběh terapie:	Před započítím NO-terapie byl pacient léčen konvenčními postupy, tyto však nepřinesly kýžený efekt. NO-terapie byla aplikována celkem 40-krát v průběhu cca dvou měsíců. Každá aplikace trvala 5 minut.
Závěr:	U pacienta došlo k markantnímu zlepšení obou defektů – paty i lýtka. Zlepšení zdravotního stavu je patrné při srovnání prvních obrázků dokumentace s posledním.

## Průběžná fotodokumentace – lýtko:

14. 10. 2013 Původní stav defektu pravé dolní končetiny na začátku NO-terapie



Stav ke dni 26. 10. 2013



Stav ke dni 02. 11. 2013



Stav ke dni 12. 11. 2013





Stav ke dni 03. 12. 2013



Stav ke dni 09. 12. 2013

