



Kazuistika: PL01-P/2013

Léčba selhání metabolismu dolních končetin

Pacient:	M.N.,
Stáří:	90 let,
Diagnóza:	Selhání metabolismu dolních končetin od kolen níže pod vlivem ischemie a infekce u chronických bérceových vředů, s rizikem vzniku gangrény pravé dolní končetiny, kde šlo o suspektní nekrotizující fasciitidu oblasti Achillovy šlachy až lýtka.
Rozsah postižení:	Rozsah problému je patrný z úvodních obrázků fotodokumentace.
Průběh terapie:	Před započítím NO-terapie byl pacient léčen konvenčními postupy, tyto však nepřinesly kýžený efekt. NO-terapie byla aplikována celkem 40-krát v průběhu cca tří měsíců. Každá aplikace trvala 5 minut.
Závěr:	U pacienta došlo k markantnímu zlepšení obou defektů – paty i lýtka. Zlepšení zdravotního stavu je patrné při srovnání prvních obrázků dokumentace s posledním.

Průběžná fotodokumentace – pata:

10. 09. 2013

Původní stav defektu paty pravé dolní končetiny na začátku NO-terapie



Detailní záběr stavu paty PDK 11. 09. 2013



Stav ke dni 09. 10. 2013



Stav ke dni 09. 11. 2013



Stav ke dni 03. 12. 2013

